

Helgjødtsel til beite – tilføring av kobolt.

Helgjødtsel 18-1-10 er godt innarbeidd som mineralgjødtsel til beite. I tillegg til høveleg grunnkjødtsling med nitrogen, fosfor og kalium på gode beiter, har ein også moglegheit til å kunna tilføra kobolt. Dei positive effektane for tilgang av kobolt i voksande dyr er rimeleg godt dokumentert, og generelt kan ein sei at det finns lite og ikkje kobolt i beitegraset vårt. Kobolt kan tilførast på fleire vis, men tilføring gjennom gjødsla sikrer effektiv og mest mogleg jamn fordeling i beitegraset.

Kobolt vert i dag tilført heilgjødsla som koboltsulfat. Det er mest vanleg med å tilføra eitt kg koboltsulfat per tonn gjødtsel. I praksis må ein då tilføra Helgjødtsel 18-1-10 i to omganger om våren med eks. 30-40 kg per daa i byrjinga av april, og om lag 20-30 kg per daa i slutten av mai.

Eit anna alternativ er å få levert Helgjødtsel tilsett 2 kg koboltsulfat per tonn. Då vil ein med eks. 30-40 kg Helgjødtsel 18-1-10 per daa tidleg om våren gi høveleg kobolttilføring for heile sesongen.